
INFORME SEMANAL N° 1221


Fecha: 5 de marzo de 2026

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2026
Detalles: El mes de febrero cerró con una corrección pluvial significativa en la mayor parte del territorio provincial, con la excepción de los dos departamentos del sudeste, con el oeste de Gualeguay más cercano a una oferta de agua normal. Las lluvias registradas, sobrepasan los valores estadísticos, del centro para el norte, en algunos sectores holgadamente. Claramente, el sudeste de la provincia ha sido el sector más castigado por la falta de precipitaciones durante el trimestre de verano.
En estos primeros días de marzo, se concretó el primer evento en el cambio del lunes para el martes. Nuevamente se ve la franja oeste con mejor provisión de agua. La influencia estabilizadora de las zonas de alta presión que transitan por BA hacia el océano, terminan agregando sectores de la franja este entrerriana. Por cercanía, el sudeste de la provincia es el sector que se ve más comprometido pro esta dinámica y esto se refleja en la continuidad de los milimetrajes muy bajos. En esta ocasión casi todos los departamentos del este han quedado marginados de las precipitaciones más generosas que se ven recostadas sobre zonas del oeste, con el máximo más homogéneo sobre el departamento La Paz y áreas reducidas sobre Paraná.
Luego de las lluvias se viene observando un cambio de circulación al este sudeste, lo cual estará dejando una mezcla de masas de aire templada a ligeramente cálida, sin promover una actividad pluvial significativa. De todos modos, durante el desarrollo del viernes, las condiciones del tiempo se volverán más inestables, con buenas chances para que reaparezcan precipitaciones, sobre todo del centro para el norte de la provincia. En general los acumulados no superarían los diez milímetros, pero pueden aparecer áreas reducidas con mayor carga pluvial. El inicio de la semana próxima también puede presentar otro breve período de inestabilidad, en este caso afectando sectores de los departamentos Paraná y Diamante, con una oferta raleada y muy modesta en otras zonas de la provincia.


PRECIPITACIÓN ACUMULA
25/02/26 al 03/03/26 (9hs 04/
CCA
200 m
190 m
180 m
170 m
160 m
150 m
140 m
130 m
120 m
110 m
100 m
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm

Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 04 DE MARZO DE 2026
Detalles: El panorama de reservas de humedad ha logrado una mejora importante, sobre todo durante las últimas tres semanas. La foto actual es más que favorable, sin que sorprenda la condición crítica que presenta el departamento Gualeguaychú y sus vecindades del sur de Uruguay y Gualeguay. Mientras que en el resto de la provincia el período seco fue extendido, se observaron auxilios esporádicos e intermitentes, los cuales se consolidaron en el último tiempo. Esto no sucedió sobre el sudeste, lo cual justifica un balance hídrico muy deficitario y proyecta resultados pobres para esta campaña. Seguramente en otros sectores de la provincia, el atraso en la recomposición pluvial también se puede haber cobrado parte del rendimiento potencial, pero son recortes que pueden considerarse razonables dentro de la volatilidad que siempre plantea la oferta de agua en la provincia durante el verano.
Con la actual disponibilidad de agua con que cuentan los cultivos, el escenario para el cierre de la campaña es favorable para zonas del oeste y el centro norte provincial. Las lluvias que llegarían en el corto plazo no serían significativas, yendo las principales recargas para los departamentos del centro y el norte, sin ningún auxilio sobre las zonas más secas.
El mes de marzo es un mes que comienza a definir una tendencia para el trimestre de otoño. Por lo general es un mes donde, sobre todo en su segunda quincena, la inestabilidad atmosférica aumenta, debido a que aumenta el contraste de masas de aire. Para la primera quincena y considerando lo que ya ha llovido, no se espera un cambio importante en el patrón de lluvias. Sería muy importante que las precipitaciones comiencen a lograr mayor despliegue y volumen en la segunda parte del mes. Esto recorta las posibilidades de que las lluvias se vuelvan recurrentes durante el mes de abril, evitando problemas con la logística de la cosecha. Por lo pronto, no se ven señales de sobreabundancia pluvial para la transición estacional.

ESTADO DE LAS RESERV
al 04/03



EXCESOS

RESERVA EXCESIV

RESERVA ÓPTIMA

RESERVA ADECUAD

RESERVA REGULAR

RESERVA ESCASA

SEQUÍA

METODO
FORTE LA

Sección: ANOMALÍA DE LA PRECIPITACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Durante febrero del 2026, las precipitaciones registradas en la provincia de Entre Ríos mostraron un comportamiento cercano al promedio histórico, aunque con una marcada heterogeneidad espacial. En promedio provincial, las lluvias alcanzaron 153 mm (ver Figura 1), superando levemente el valor medio histórico del mes, lo que indica una condición general próxima a la normalidad, aunque con sectores donde se registraron anomalías tanto positivas como negativas.



Figura 1: Promedio de la precipitación mensual en Entre Ríos versus año 2026.

El promedio histórico de precipitación para el mes de febrero en la provincia de Entre Ríos se ubica aproximadamente entre 95 mm y 168 mm, dependiendo de la región. Durante febrero de 2026, el promedio provincial registrado fue de 153 mm, lo que representa un leve incremento respecto al valor medio histórico.

En cuanto a los valores extremos registrados por la red de estaciones meteorológicas, el mínimo acumulado fue de 47 mm en el departamento Gualeguaychú, mientras que el máximo alcanzó los 260 mm en el departamento Federal. Esta amplitud en los registros evidencia una importante variabilidad espacial de las precipitaciones durante el mes.

Al analizar la evolución de las precipitaciones acumuladas en el año, se observa que enero presentó lluvias significativamente inferiores al promedio histórico, mientras que febrero registró valores levemente superiores al promedio mensual esperado (153 mm frente a 138 mm históricos). Este comportamiento permitió una recuperación parcial del déficit hídrico generado durante el primer mes del año, aunque el acumulado anual aún se mantiene ligeramente por debajo de los valores históricos esperados para el período enero – febrero.

La distribución espacial de las precipitaciones durante febrero de 2026 mostró un patrón heterogéneo dentro del territorio provincial.

Los mayores acumulados se registraron principalmente en el centro y norte de la provincia, con valores que superaron los 210 mm en sectores de los departamentos Federal, Villaguay y áreas cercanas, e incluso alcanzaron los 260 mm en el departamento Federal.

Por otro lado, los menores registros se localizaron en el sector sur y sudeste, particularmente en Gualeguaychú y áreas cercanas, donde las precipitaciones se ubicaron en rangos de 47 a 120 mm, valores inferiores a los promedios históricos para el mes.

El análisis de la anomalía de la precipitación mediante el índice indica que la mayor parte del territorio provincial se mantuvo dentro de condiciones normales.

No obstante, se identificaron sectores del centro y norte con condiciones moderadamente a severamente húmedas, asociadas a los elevados acumulados registrados en dichas regiones.

En contraste, áreas localizadas en el sudeste de la provincia presentaron condiciones de sequía moderada.

En términos generales, febrero de 2026 presentó precipitaciones cercanas o levemente superiores al promedio histórico en Entre Ríos, con un promedio provincial de 153 mm.




Figura 2. Precipitación acumulada en febrero del 2026, promedio histórico para febrero (2004–2025) y anomalía de febrero del 2026.

Sección: CONDICIÓN DE LA SOJA DE PRIMERA

La superficie sembrada con soja de primera en la provincia de Entre Ríos en el ciclo 2025/26 se posicionaría en 300.000 ha aproximadamente.

Actualmente, el estado fenológico de la oleaginosa se encuentra mayoritariamente entre R4 (fin de formación de vainas) y R6 (grano lleno), donde una proporción significativa del área está transitando R5 (inicio de llenado de granos).

En términos generales, el cultivo se ubica en plena etapa de llenado de granos, período clave para la definición del peso final y fuertemente condicionado por la disponibilidad hídrica y las condiciones ambientales.

Cabe recordar que, la oleaginosa soportó un pulso seco que se prolongó durante tres semanas, desde la segunda quincena de enero hasta los primeros 10 días de febrero, donde las lluvias retornaron a la región.

Esto tuvo un impacto negativo en la condición de la soja y las perspectivas de rendimiento, las cuales se han recuperado gradualmente, aunque es clave destacar que el sector Sur conserva un desvío negativo de precipitaciones con respecto a la media del territorio provincial.

En función de consultas realizadas a la red de colaboradores se determinó la condición de la oleaginosa, la cual se resume del siguiente modo:

- Muy buena 14 %
- Buena 45 %
- Regular 32 %
- Mala 9 %

En la Figura 1 se presenta la evolución de la condición de la soja de primera entre los rangos muy buena a buena versus regular a mala desde el 6 de febrero, donde se aprecia que, en los últimos 15 días la situación de la oleaginosa no ha experimentado variaciones.




Figura 1: Evolución de la condición de la soja de primera y perspectiva actual por zonas en la provincia de Entre Ríos.

A nivel provincial se proyecta un rendimiento promedio de 2.300 kg/ha que representaría una caída interanual del 14 % (381 kg/ha), ya que el valor promedio del ciclo 2024/25 fue de 2.681 kg/ha. Mientras que, en relación al promedio del último lustro cuyo valor se ubica en 2.136 kg/ha, se observa un incremento del 8 % (164 kg/ha).

De concretarse los actuales valores de rendimientos, la producción se ubicaría en torno a 690.000 t.



Figura 2: Soja de primera. Gualeguaychú. Ing. Agr. Pablo Glagobsky

Sección: CONDICIÓN DE LA SOJA DE SEGUNDA

La superficie proyectada de la soja de segunda en la provincia de Entre Ríos para el ciclo 2025/26 se estima en aproximadamente 750.000 ha.

El estado fenológico se ubica entre R1 (inicio de floración) y R4 (inicio de formación de vainas); por lo tanto, el cultivo está comenzando el período crítico, que se extiende aproximadamente desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5 (inicio de llenado de granos).

Los datos aportados por la red de colaboradores reflejan una recuperación de la condición de la oleaginosa. A nivel provincial, la situación se sintetiza del siguiente modo:

- Muy buena: 20 %
- Buena: 47 %
- Regular: 25 %
- Mala: 8 %

En los últimos 15 días se registró un incremento del 5 % en las categorías buena a muy buena, que pasaron del 62 % al 67 %. Cabe destacar que a inicios de febrero solo el 46 % del área se encontraba dentro de ese rango.

Por otra parte, el único sector donde disminuyó la proporción de soja de segunda calificada como buena a muy buena es el Sur: el 20 de febrero registraba el 66 % y actualmente se sitúa en el 58 %, lo que representa una caída de 8 %. Es indispensable que se generen lluvias superiores a los 60 mm en este sector para que la oleaginosa no siga perdiendo potencial de rendimiento.




Figura 1: Condición de la soja de segunda por sectores en la provincia de Entre Rios.

Sección: CONDICIÓN DEL MAÍZ TARDÍO Y DE SEGUNDA

El maíz de segunda y tardío en la provincia de Entre Ríos se estima en 20.000 ha para el ciclo 2025/26.
El estado fenológico del cultivo abarca desde VT (Panojamiento) a R3 (Grano lechoso).
A nivel provincial, la condición del cultivo se clasifica:
Muy buena: 20 %

Buena: 28 %
Regular: 37 %
Mala: 15 %




Figura 1: Condición de maíz tardío y segunda por zona de la Provincia.

En conjunto, las categorías muy buena y buena abarcan el 48 % de la superficie. correspondiente a lotes sembrados en fechas tempranas.
El 52 % restante, clasificada como regular y mala, corresponde mayormente a áreas afectada por el déficit hídrico y las altas temperaturas.
En estos sectores, el cultivo presenta síntomas de estrés. Se observan plantas desarrolladas pero con un tamaño menor a lo habitual, con lo cual afectaría de manera irreversible al potencial del cultivo.
Se registra presencia de chicharrita en algunos sectores, pero los colaboradores indicaron que

no ya no se realizan controles del insecto.



Figura 2: Maíz tardío. A: Ing. Agr. Daniel Sangoy. Paraná B: Ing. Agr. Pablo Glagovsky. Gualeguaychú

Sección: COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN ENTRE RÍOS EN FEBRERO DEL 2026

Durante el mes de febrero, en la provincia se comercializaron 171.020 toneladas de maíz, 64.023 toneladas de soja y 104.418 toneladas de trigo.

La actividad comercial del mes de febrero cerró con un volumen total operado de 339.460 toneladas. El maíz ratificó su liderazgo absoluto concentrando el 50% de la plaza, con un promedio semanal de 42.755 toneladas operadas. Si bien el cereal mantuvo un ritmo sostenido a lo largo del período, su mayor dinamismo se registró hacia el cierre del mes. Por su parte, el trigo acentuó su tendencia a la desaceleración respecto a enero, mostrando una caída intermensual del 42% y concentrando sus mayores operaciones durante la primera quincena. Finalmente, la soja totalizó 64.024 toneladas, manteniendo un perfil estable pero aún rezagado en la operativa provincial. Mientras que tanto en maíz como en trigo predominaron las operaciones a precio hecho (83% y 74% respectivamente), en el caso de la soja sólo el 43% se comercializó con esta modalidad, predominando las entregas con precio a fijar.

En la Figura 1 se muestran las ventas acumuladas en toneladas durante el mes y las comercializadas durante cada semana.




Figura 1. Toneladas comercializadas acumuladas en el mes de febrero de 2025 en Entre Ríos. Fuente: BOLSACER en base a SIO Granos.

Respecto al precio al cual se comercializó durante el mes, utilizando como fuente las operaciones cargadas para la provincia en SIO Granos, las ventas de soja promediaron los $549.300, las de trigo $245.000 y las de maíz $252.000.

La evolución de las cotizaciones durante febrero estuvo fuertemente condicionada por la sostenida apreciación del peso. El tipo de cambio mostró una marcada tendencia bajista a lo largo de todo el mes, comenzando febrero situado en $1451 para luego lograr perforar la barrera de los $1.400 en la tercera semana.

Este escenario macroeconómico ejerció un claro efecto de arrastre sobre las pizarras, resultando en pérdidas generalizadas en las cotizaciones en pesos en todos los cultivos, copiando la evolución del tipo de cambio a lo largo del mes. El maíz fue el cultivo más castigado en términos nominales, sufriendo un deterioro constante que le hizo ceder más de $30.000 desde su apertura, para cerrar el mes en sus mínimos de $242.900. La soja, por su parte, experimentó una caída progresiva hasta tocar un piso de $455.000 el 24/02, logrando un leve rebote en los últimos días para posicionarse en $465.000 al cierre. Finalmente, el trigo no logró abstraerse del clima general y acompañó el descenso, retrocediendo desde los $258.840 iniciales para consolidar un soporte en torno a los $250.000 en la última semana del mes.

Por otra parte, si bien la cotización en dólares de la soja y trigo se mantiene estable, la cotización de maíz medida en moneda extranjera sufrió una retracción del 3%.

Sección: BOLSACER EN EXPOAGRO

