

INFORME SEMANAL N° 1223

Fecha: 19 de marzo de 2026

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2026
Detalles: La semana ha transcurrido bajo condiciones de circulación asociadas un anticipo de la transición estacional, con vientos que tendieron a recircular una masa de aire bastante húmedo, pero sin una dinámica propicia para el desarrollo de sistemas precipitantes. Solo durante el día viernes y el comienzo del sábado, un pasaje frontal potencio en forma sectorizada los desarrollos nubosos, promoviendo algo más de inestabilidad. Dentro de este período, se concretaron precipitaciones menores, con áreas reducidas donde aparecieron algunas tormentas. En general, los totales pluviales estuvieron por debajo de los cinco milímetros o se dieron lloviznas con muy escasos registros. En parte del departamento Uruguay, las lluvias acumularon hasta quince milímetros.
Como mencionamos, en lo que va de marzo, la circulación de aire está anticipando el cambio estacional. Las jornadas muy cálidas han sido excepcionales. Dado que las lluvias no están siendo significativas, el tiempo viene siendo favorable para avanzar con la cosecha. Pero esto es temporario, se viene configurando una situación con mucho potencial para producir lluvias de gran cobertura y buen volumen en toda la provincia.
En efecto, pro estas horas, el viento del este y noreste, estará reforzando la disponibilidad de vapor de agua en la atmosfera baja. Durante mañana, se espera que una onda frontal comience a recorrer la región pampeana avanzando desde el sudoeste. Este mecanismo elevará la humedad a planos de la atmosfera media y facilitará el desarrollo de nubes de tormenta. Este sería uno de los eventos más importantes del mes en cuanto al volumen y a la distribución homogénea que presentarán las precipitaciones. Si bien se espera un mejoramiento temporario entre sábado y domingo, llegará una segunda perturbación iniciando la semana, con lo cual se reforzarán los acumulados de lluvia. En muchos sectores cerraremos este evento pluvial por encima de los ochenta milímetros.


PRECIPITACIÓN ACUMULADA
11/03/26 al 17/03/26 (9hs 18/03)
CCA
200 mm
190 mm
180 mm
170 mm
160 mm
150 mm
140 mm
130 mm
120 mm
110 mm
100 mm
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm

Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 18 DE MARZO DE 2026
Detalles: Las reservas de humedad, acusan el paso de una semana con precipitaciones escasas, aunque la disponibilidad de agua ya presenta una demanda más bien sectorizada, de aquellos cultivos de segunda implantación que aún no cierran su ciclo. Como sea, estamos en las vísperas de un evento pluvial significativo y se espera que el balance hídrico tenga una corrección muy significativa, la cual, finalmente, sacara de la sequía al sudeste de la provincia, posiblemente provocando excesos hídricos temporarios en otros departamentos.
En esta época del año siempre volvemos sobre el concepto del delicado equilibrio entre las muy necesarias recargas de humedad del otoño y el buen tiempo requerido para avanzar en forma eficiente con la cosecha. Es una época en que naturalmente se ven favorecidos los máximos pluviales. Aumenta la frecuencia de ondas frontales y aún es muy alta la disponibilidad de humedad. Es decir, la combinación de variables y la dinámica es una de las más favorables del año como para que las lluvias logren aumentar los milimetrajes y ganar cobertura.
Desde estas fechas hasta mediados de abril, posiblemente nos mantengamos dentro de un período con al menos un evento semanal. Resulta muy importante el seguimiento de los pronósticos de corto plazo, para organizar las tareas de cosecha. En este sentido será decisivo el estado en el que queden los caminos rurales una vez que se concreten las lluvias esperadas para estos días.
A lo largo del verano hemos venido monitoreando la influencia del fenómeno La Niña sobre la provincia. En el resumen del trimestre de verano las lluvias alcanzaron niveles normales en la mayor parte del territorio, abundantes hacia el norte, deficitarias hacia el sudeste. Esto no deja atrás, el hecho de que la distribución temporal de las precipitaciones no haya logrado la eficiencia esperada. Extendidos períodos secos a lo largo del trimestre estival, seguramente tendrán un sesgo negativo en la producción.


ESTADO DE LAS RESERVAS
al 18/03/26
CCA
EXCESOS
RESERVA EXCESIVA
RESERVA ÓPTIMA
RESERVA ADECUADA
RESERVA REGULAR
RESERVA ESCASA
SEQUÍA
METODO FORTE LAY

Sección: COSECHA DE SORGO

El área implantada con sorgo en el ciclo 2025/26 se posicionaría alrededor de 55.000 hectáreas, con una retracción en relación al año pasado del 55 %.

Es importante recordar que, el sorgo granífero abarcó el 56 % (31.000 ha) y el área restante, cerca de 24.000 ha fue sembrada con sorgo tipo doble propósito o forrajeros.

En base a consultas efectuadas a la red de colaboradores se estimó un avance en las labores de cosecha del 40 % con un rendimiento promedio provincial de aproximadamente 4.000 kg/ha. Cabe mencionar que a nivel de lote los valores mínimos se posicionaron a partir de 2.000 kg/ha y los valores máximos en 6.000 kg/ha.

Los colaboradores reportan problemas en la cosecha debido a plantas caídas asociadas a un cuadro de podredumbre en la base del tallo, debido posiblemente a la presencia de patógenos de suelo como Fusarium y Macrophomina.

Esta situación se vincula con floraciones hacia el mes de enero bajo condiciones de alto estrés hídrico, lo que favoreció una intensa removilización de reservas desde el tallo hacia el grano. A este proceso se suma el efecto del pulgón amarillo, que posiblemente incrementa el debilitamiento estructural de la caña, facilitando el ingreso y desarrollo del complejo de hongos. Como resultado, se produce un deterioro del tejido basal, pérdida de resistencia mecánica y vuelco generalizado de las plantas, tal como se observa en la imagen (Figura 1).



Figura 1: Debilitamiento del tallo de sorgo por presencia de Fusarium. Gentileza: Ing. Agr. Anton Montenegro.

Sección: PERSPECTIVAS EN LA PRODUCCIÓN DE SOJA EN EL CICLO 2025/26

En primer lugar, es importante señalar que el verano de 2026 presentó mayores exigencias para el cultivo en comparación con el año anterior, debido a que el pulso seco fue más prolongado y se extendió desde la segunda quincena de enero hasta los primeros diez días de febrero. A esto se suma que el sector sur aún no ha logrado revertir la situación, ya que desde diciembre registra precipitaciones por debajo de los valores normales.

En cuanto a la soja de primera, el área cultivada se ubica en torno a las 300.000 ha, representando aproximadamente el 29 % del total. Se proyecta un rendimiento promedio provincial de 2.300 kg/ha, lo que, de concretarse, implicaría una caída interanual del 14 % (381 kg/ha). Sin embargo, en comparación con el promedio del último lustro, se observaría un incremento del 8 % (164 kg/ha). En consecuencia, la producción estimada de soja de primera alcanzaría las 690.000 t.

Por otro lado, la soja de segunda abarca una superficie cercana a las 750.000 ha, con una participación del 71 % del área total. El rendimiento promedio proyectado se sitúa en 2.000 kg/ha y al encontrarse dentro de su periodo crítico, la ocurrencia de lluvia es de alto impacto para que este valor no se vea afectado. De este modo, se prevé una caída interanual del 25 % (680 kg/ha), aunque, respecto del promedio del último quinquenio, se evidenciaría un incremento del 10 % (189 kg/ha). En este escenario, la producción estimada de soja de segunda sería de 1.500.000 t.

En síntesis, sobre una superficie total estimada de 1.050.000 ha, se proyecta un rendimiento promedio de 2.086 kg/ha y una producción total de 2.190.000 t con una merma interanual del 36 % (1.254.725 t) Figura 1.




Figura 1: Evolución de la superficie y producción de soja total en Entre Ríos.

Si se comparan las variables de superficie (1.094.440 ha) y producción (2.174.945 t) del último quinquenio, con las proyectadas para la campaña 2025/26, se observa una caída cercana al 4

% en el área sembrada, mientras que la producción estimada se ubicaría levemente por encima de dicho promedio, con un incremento cercano al 1 %.

Sección: CONDICIÓN DE MAÍZ DE SEGUNDA Y TARDÍO

El área destinada a la siembra de maíz de segunda y tardío en la provincia de Entre Ríos se posicionaría cercana a las 20.000 ha en el ciclo 2025/26.

El estado fenológico del cereal se encuentra desde R2 (grano ampolla) hasta R4 (grano pastoso).

Se realizó consultas a la red de colaboradores para determinar la condición del cultivo, la cual a nivel provincial se resume del siguiente modo:

- Muy buena 18 %
- Buena 39 %
- Regular 33 %
- Mala 10 %

En los últimos 15 días se registró una mejora de los lotes calificados de buenos a muy buenos del 9 %, ya que al 5 de marzo abarcan el 48 %.

En la Figura 1 se muestra la condición de los lotes de maíz tardío y de segunda por zonas.




Figura 1: Condición del maíz tardío y de segunda por zonas en la provincia de Entre Ríos.

El sector Oeste es el que cuenta con una mejor perspectiva, ya que el 77 % del área se encuentra entre la condición de buena a muy buena, mientras que en el resto del territorio este rango fluctúa entre el 25 al 55 %.

Sección: COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN ENTRE RÍOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026

Durante la primera quincena de marzo, en la provincia se comercializaron 93.314 toneladas de

maíz, 34.944 toneladas de soja y 43.887 toneladas de trigo.

Durante toda la quincena se observó muy elevado movimiento en maíz, especialmente en la primera semana de marzo. El cereal concentró el 54% de las operaciones, con 93.314 toneladas operadas y un fuerte dinamismo inicial que tocó un pico de 18.626 toneladas el 02/03. Mientras tanto, las operaciones de maíz y trigo quedaron rezagadas. Mientras en la primera semana se negociaron 112.241 toneladas totales, en la segunda semana la cifra ascendió a 59.904.

En la Figura 1 se muestran las ventas acumuladas en toneladas durante esta primera quincena y las comercializadas durante cada semana.




Figura 1. Toneladas comercializadas acumuladas en la primera quincena de marzo de 2026 en Entre Ríos. Fuente: BOLSACER en base a SIO Granos.

Las ventas de maíz en la provincia, durante la primera quincena, promediaron los $243.500, las de trigo $248.200 y las de soja $460.000.

A diferencia de la marcada caída de febrero, el escenario de precios durante la primera quincena de marzo exhibió una estabilización cambiaria. El dólar encontró un piso, oscilando levemente hasta tocar un pico intermedio de $1.416 el 06/03, para finalizar el período en $1.400. Esta pausa en la apreciación del peso dio lugar a una recuperación generalizada en las cotizaciones. El maíz lideró el repunte, revirtiendo el deterioro previo para escalar más de $15.000 desde su apertura y cerrar la quincena en $251.800. La soja acompañó esta tónica positiva, partiendo de los $460.000 iniciales para consolidar un rebote que la posicionó en $475.000 al cierre. Por su parte, el trigo mostró mayor volatilidad: tras alcanzar un máximo de $260.000 a mediados del período, ajustó posiciones para finalizar en $254.550, logrando igualmente un saldo quincenal positivo.

Los recientes conflictos internacionales elevaron la cotización de los commodities a nivel mundial, influyendo al alza en los precios pizarra locales, que vieron alzas a lo largo de la quincena tanto en moneda local como en dólares.


Sección: EVOLUCIÓN DEL PODER DE COMPRA DE LOS GRANOS FRENTE A LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN 2025



La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través de su sistema de información agrícola (SIBER), analiza la evolución de la relación capital-producto de los granos frente a la maquinaria agrícola en el año 2025 y en su comparativo frente a los últimos cuatro años.

? Leé la nota completa: NOTA COMPLETA

Sección: A3 MERCADOS: USOS Y BENEFICIOS DEL NUEVO MERCADO



INCRIPCIONES

Sección: NUEVO CANAL DE DIFUSIÓN BOLSACER



Desde el 1 de abril la información difundida por BolsaCER se hará exclusivamente por el Canal de Difusión de WhatsApp. Sumate y activá la campanita para activar las notificaciones:

CANAL DE DIFUSIÓN