INFORME SEMANAL N° 1242

Fecha: 30 de julio de 2026

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2026
Detalles: Hemos transitado otra semana donde la humedad y las coberturas de nubes bajas mantuvieron un protagonismo persistente. Las madrugadas y mañanas con neblinas, contribuían a mantener el manto estratiforme, lo cual, en forma ocasional y dispersa, se concretaba en algunas lloviznas.
Como se puede ver en el mapa, las lluvias más importantes se concretaron sobre el noreste de la provincia, con el departamento Federación recogiendo el mayor volumen pluvial, con precipitaciones que se observaron hasta este último martes. En general, en el resto de la provincial las lluvias se sumaron a partir de lloviznas. En la mayoría de los casos los acumulados no superan los dos milímetros. Muchos de estos registros se detectan en las estaciones automáticas de la BCER, dado que los pluviómetros convencionales presentan una lectura dificultosa.
Las condiciones ambientales se mantienen sin mayor cambio. Ha ingresado un poco de aire desde el sudeste y con la ayuda del anticiclón en superficie, se ha quebrado el manto nuboso, pero esto es circunstancial. La disponibilidad de humedad sigue siendo muy elevada y durante la jornada de mañana la circulación de aire desde el norte será muy intensa, de modo que las temperaturas alcanzaran valores que pueden considerarse veraniegos.
Los altos niveles de humedad y la inestabilidad que provocara la llegada de aire cálido, converge con el avance de un frente frío. Esta dinámica dejara un cierre de julio muy activo para toda la provincia. Las lluvias pueden cerrar el día de mañana en el sur y, durante la madrugada del sábado, avanzar sobre el resto de la provincia. Los acumulados serían significativos, tanto que el paso deficitario que viene dejando julio puede corregirse casi hasta la normalidad, volviéndose abundante en el noreste de la provincia. Luego de las lluvias, se perfila un enfriamiento moderado, que devuelve las temperaturas a valores similares a los observados en las últimas jornadas.


PRECIPITACIÓN ACUMULADA
22/07/26 al 28/07/26 (9hs 29/07)
CCA
200 mm
190 mm
180 mm
170 mm
160 mm
150 mm
140 mm
130 mm
120 mm
110 mm
100 mm
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm

Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 29 DE JULIO DE 2026
Detalles: La disponibilidad de humedad sigue siendo satisfactoria en toda la provincia, con un gradiente positivo desde el sudoeste hacia el este noreste, donde prevalecen los excesos. Si bien las lluvias no han sido importantes a gran escala, el ambiente ha resultado menos exigente que lo habitual para esta época del año, con lo cual apenas se ha perdido humedad. Los cultivos de invierno transitan este período sin ninguna demanda.
Si se validan las precipitaciones para el cierre del viernes y el sábado, gran parte de la provincia evolucionara temporariamente hacia un nivel de reservas excesivas. Esto define condiciones que generan un contexto sanitario que puede volverse perjudicial y que exigirá un monitoreo prematuro de los lotes de la fina.
Si bien la primera semana de agosto no será demasiado fría, se perfila un enfriamiento más marcado para el segundo fin de semana del mes y los días subsiguientes. Si se confirma esta dinámica, se establecería lo que posiblemente sería el último enfriamiento riguroso del invierno, aunque deberemos acercarnos a la fecha para confirmar la potencial aparición de heladas fuertes.
Otro aspecto a destacar, involucra el comportamiento del Río Uruguay. Esta cuenca ha tenido una rápida respuesta a las excesivas lluvias que se vienen observando en la naciente del río y la contribución de los afluentes del lado brasileño. La persistencia de lluvias en el sur de Brasil como así también en la provincia de Misiones, aunque en menor medida, se establece como la primera evidencia de la afectación del patrón pluvial por parte de El Niño. Esto ya se ha reflejado corriente abajo sobre las costas de los departamentos del este.
Las lluvias esperadas en la transición del viernes para el sábado responderán a la acumulación de humedad de las últimas dos semanas. Justamente es una época del año donde la disponibilidad de humedad debería ser ostensiblemente más baja. Esto es otro indicador de la alteración del patrón de circulación por El Niño.


ESTADO DE LAS RESERVAS
al 29/07/26
CCA
EXCESOS
RESERVA EXCESIVA
RESERVA ÓPTIMA
RESERVA ADECUADA
RESERVA REGULAR
RESERVA ESCASA
SEQUÍA
METODO FORTE LAY

Sección: CONDICIÓN DE TRIGO

Finalizada las labores de siembra, se consultó a la red de colaboradores sobre la variación interanual observada en la superficie destinada al cereal, la cual se ubica en el valor proyectado de 600.000 ha y que representaría una caída interanual del 18 % (129.900 ha), ya que en el ciclo 2025/26 el área fue de 729.900 ha.

No obstante, esta tendencia se verificará con imágenes satelitales en a partir del mes de octubre para poder obtener con precisión la superficie cultivada con trigo.

Los estados fenológicos de los lotes sembrados a mediados de mayo se posicionan entre pleno macollaje y primer nudo, mientras que las siembras de mediados de julio cuentan con un desarrollo de tres hojas a inicio de macollaje.

Por otra parte, se consultó a la red de colaboradores sobre la condición general del trigo, la cual se resume de la siguiente forma:

- Muy buena 40 %
- Buena 59 %
- Regular 1 %

El promedio de la condición de los lotes de buenos a muy buenos de los últimos cinco años hacia finales de julio es del 95 % y actualmente este rango abarca el 99 % del área total.



Figura 1: Condición del cultivo de trigo por zonas y comparación de la situación en los últimos cinco años a fines de julio en la provincia de Entre Ríos.

Se realizó una breve encuesta a la red de colaboradores sobre las variedades de trigo más utilizadas en el presente ciclo agrícola (Figura 2), la cual abarcó aproximadamente el 20 % del área implantada.

Los resultados muestran una alta concentración varietal de DM Catalpa con una participación del 42 %, seguida por DM Aromo 12 %, Baguette 620 con el 11 %, DM Pehuén 9 % y DM Araucaria 6 %.

Estas cinco variedades representan casi el 80 % del total encuestado, lo que refleja una marcada preferencia por materiales de ciclos intermedio a intermedio – corto, donde predominan cultivares pertenecientes al grupo de calidad 2 que ofrecen un adecuado equilibrio entre rendimiento y calidad panadera.



Figura 2: Participación de las 15 variedades más sembradas en función de la encuesta de trigo para el ciclo 2026/27 en la provincia de Entre Ríos.

Sección: ACTUALIZACÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE SIEMBRA DE MAÍZ PARA EL CICLO 2026/27

En pocos días dará inicio la siembra de maíz correspondiente al ciclo agrícola 2026/27. Con el objetivo de estimar la superficie a implantarse, se consultó a los semilleros y en función de los datos obtenidos se proyecta una intención de siembra de 570.000 ha, lo que representaría un incremento interanual del 3 % (19.950 ha).

En la Figura 1 se presenta la evolución del área sembrada desde el ciclo 2000/01 hasta la proyección para 2026/27. Se observa que la superficie pasó de 214.500 ha en 2000/01 a 550.050 ha en 2025/26, lo que implica un crecimiento del 159 % (340.550 ha), equivalente a una expansión promedio cercana a 14.000 ha/año.

Al analizar los últimos cinco ciclos agrícolas, es decir los datos históricos más recientes, se advierte que entre 2021/22 que contaba con 509.700 ha presentó un aumento del 9 % (45.350 ha) con relación al ciclo 2025/26. No obstante, durante la campaña 2024/25 la fuerte incidencia de la chicharrita del maíz provocó una marcada retracción del cultivo, reduciendo el área sembrada a apenas 298.500 ha. Posteriormente, la disminución de la población del insecto

permitió la recuperación del cereal y el retorno a la tendencia histórica de expansión.

Desde el punto de vista climático, el pronóstico de un evento «El Niño» para la campaña 2026/27 constituye un escenario favorable para el maíz. En Entre Ríos, este fenómeno suele incrementar las precipitaciones durante el período crítico del cultivo (noviembre – enero), cuando habitualmente la demanda atmosférica de agua supera la oferta de lluvias, generando déficits hídricos que limitan el rendimiento.

En años con eventos «El Niño», el rendimiento promedio provincial del maíz alcanza aproximadamente 7.200 kg/ha. Si se concreta la proyección de 570.000 ha y se considera que 10.000 ha se destinarán al consumo animal directo, la producción provincial se ubicaría en torno a 4.032.000 toneladas.



Figura 1: Evolución de la superficie sembrada con maíz en la provincia de Entre Ríos del ciclo 2000/01 al 2025/26 y proyección para el ciclo 2026/27.

Sección: CONDICIÓN DE LINO

La superficie estimada implantada con lino para la campaña 2026/27 asciende a 9.500 ha.
A nivel provincial, el cultivo se encuentra en estado vegetativo, con un desarrollo que abarca desde 2 hasta 15 pares de hojas verdaderas en el tallo principal. Figura 1.

La condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:
Muy buena: 49 %
Buena:45 %
Regular: 6 %
Mala: 0 %.

Figura 1: Lino. A. Dpto. Federal, Ing. Agr. Lucas Jefferies. B Dpto. Colón, Ing. Agr. Damián Grantón

Los colaboradores informaron que las labores de resiembra han finalizado y que la emergencia del cultivo fue evaluada mayoritariamente entre muy buena y buena. Asimismo, señalaron una evolución favorable de los lotes que habían resultado afectados por las heladas y las precipitaciones registradas durante el mes de junio, evidenciando una adecuada recuperación del cultivo.

Sección: CAPACITACIONES MERCADOS

Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos te invitamos a participar de la segunda jornada de formación a cargo de la Lic. Mariana Pellegrini, del equipo de A3 Mercados.

- Estrategias de cobertura con FYO Agrícolas
- Jueves 13 de agosto

- De 9:00 a 16:00 hs
- BolsaCER (San Martín 553)
- Modalidad presencial

- Actividad arancelada – Cupos limitados (más información en el formulario de inscripción)

Inscribite acá:https://forms.gle/PQNxbXnVeXmr5RRe8

Sección: PODCAST BOLSACER #9: ¿MÁS NIÑO SIGNIFICA MÁS LLUVIA? LO QUE DICE LA CIENCIA

Sección: RED DE MONITOREO DE CHICHARRITA - INTA, CENTRO REGIONAL ENTRE RÍOS

Información sobre *Dalbulus maidis* en avena, trigo, colza, vicia y alfalfa

en Entre Ríos

52 INFORME- PERÍODO 24 al 29 de julio de 2026

Se detectó la presencia de *Dalbulus maidis* en 3 de los 14 sitos monitoreados por los profesionales que integran la Red.



A continuación, se detallan los valores correspondientes a la densidad de chicharritas por m^2

en avena, avena + vicia, trigo y alfalfa (Tabla 1, 160 golpes de red). Además, se presentan datos provenientes de las capturas en trampas cromáticas adhesivas (Tabla 2), pertenecientes a profesionales del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria (CIAV), de la AER Victoria y de la EEA Paraná del INTA.

Tabla 1. Densidad de chicharrita por m^2 de acuerdo con el cultivo/pastura y sitio monitoreado.

Sitio	Cultivo	Densidad (chicharrita/m^2)
Nogoyá	Alfalfa	0,000
Crespo	Alfalfa	0,000
Colón	Alfalfa	0,000
Gualeguay	Avena + Vicia	0,000
Gualeguaychú	Trigo voluntario	0,000
Rosario del Tala	Trigo	0,000
Paraná	Trigo	**0,025**
Diamante	Trigo	0,000
María Grande	Avena	0,000

Tabla 2. Densidad de chicharrita por trampa cromática adhesiva de acuerdo con el sitio monitoreado o nombre del Establecimiento y cultivo.

	Sitio	Cultivo-EF	Densidad (chicharrita/trampa)
Departamento Victoria	Don Bernardo	Trigo	2
	Febre	Colza	0
	Rincón de Nogoyá	Vicia	0
	El Mambú	Vicia + Colza	0
Departamento Paraná	EEA Paraná	Colza	15

Consideraciones:

- Si bien se observa una disminución en la cantidad de chicharritas capturadas tanto con red de arrastre como en trampas cromáticas adhesivas en cultivos no hospedantes, es fundamental continuar con los monitoreos a fin de determinar el impacto de las bajas temperaturas sobre las poblaciones invernales de *maidis*.
- **El MONITOREO de chicharritas en cultivos no hospedantes y los análisis moleculares para determinar la cantidad de ellas que son portadoras de patógenos, en este periodo, previo a la siembra de maíz de primera es FUNDAMENTAL, ya que permitirá programar con antelación posibles estrategias**

de manejo del insecto vector.

- Seguir los Informes de la Red Nacional de Monitoreo mediante trampas cromáticas adhesivas (https://www.argentina.gob.ar/red-nacional-de-monitoreo-informes).

Sección: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO ENTRERRIANA

Destino de la producción de trigo entrerriana